

OTROŠKE NALEZLJIVE BOLEZNI

ČREVESNI VIRUSI

INKUBACIJSKA DOBA
1-3 dni

KUŽNOST
preneha po 48 urah od zadnjega
bruhanja oz. driske

ZNAKI
slabost, bruhanje, krči v trebuhu,
driska, povišana telesna
temperatura

ŠKRLATINKA

INKUBACIJSKA DOBA
običajno 1-3 dni

KUŽNOST
od začetka bolezenskih znakov
do 24 ur po antibiotičnem zdravljenju

ZNAKI
podobni kot pri angini, drug dan
bolezni se pojavi kožni izpuščaj

PRENOS OKUŽBE
kapljično in ob stiku

HERPES

INKUBACIJSKA DOBA
10 do 23 dni

KUŽNOST
2 dni pred pojavom izpuščaja in
5 dni po zadnjem zagonu. Virus
ostane v telesu celo življenje.

ZNAKI
mehurčkaste spremembe na omejenem
delu kože ali sluznic

PRENOS OKUŽBE
ob tesnem stiku, preko sline,
redkeje prek predmetov

NORICE

INKUBACIJSKA DOBA
14 dni

KUŽNOST
prične se 2 dni pred pojavom izpuščaja
in traja do 5 dni po pojavu krast

ZNAKI
značilni izpuščaji

PRENOS OKUŽBE
kapljično in aerosolno

PREVENTIVNI UKREPI
prezračevanje, cepljenje
z 2 odmerkoma cepiva

BOLEZEN NOG, ROK IN UST

INKUBACIJSKA DOBA
14 dni

KUŽNOST
še pred pojavom bolezenskih težav,
virus se lahko izloča tudi, ko so
mehurčki že suhi

ZNAKI
vročina, mehurčki (najpogosteje na
dlaneh, podplatih, v ustih)

PRENOS OKUŽBE
direktno ob stiku s slino, izločkom iz nosu,
blatom, lahko tudi ob stiku s površinami

ANGINA

INKUBACIJSKA DOBA
običajno 2-3 dni

KUŽNOST
od začetka bolezenskih znakov
do 24 ur po antibiotičnem zdravljenju

ZNAKI
mrzlica, visoka vročina,
glavobol, pri otrocih bolečine v
trebuhu, bruhanje, močno rdeče
žrelo in pordeli nebnici z
gnojnimi čepki, povečane in
boleče vratne bezgavke

PRENOS OKUŽBE
kapljično in ob stiku

UŠIVOST

ZNAKI
prisotnost uši in gnid, neprijetno srbenje

PRENOS OKUŽBE
običajno z neposrednim dotikom,
redkeje pred brisač, posteljnino, krtač
in podobnih predmetov

UKREPANJE
uporaba sredstva proti
naglavnim ušem, razuševanje,
vsakodnevno pregledovanje
lasišča, obvestilo vseh tesnih
stikov iz preteklih 14 dni

ČREVESNI VIRUSI

INKUBACIJSKA DOBA
1-3 dni

KUŽNOST
virus je v blatu lahko že pred pojavom
simptomov in ostane do 14 dni po okužbi

ZNAKI
driska, bruhanje, slabost in želodčne bolečine,
lahko tudi vročina in glavobol

PRENOS OKUŽBE
fekalno-oralni in aerosolno

PREVENTIVNI UKREPI
izolacija obolelih, umivanje rok, mokro
čiščenje, prezračevanje, cepljenje

VNETJE OČESNE VEZNICE

POVZROČITELJI

bakterije, adenovirusi, tudi alergije

KUŽNOST

bakterijsko vnetje: preneha po 48 urah
virusno vnetje: 10-12 dni po pojavu vnetja

ZNAKI

bakterijsko vnetje: pordelost,
gnojen izcedek, občutek tujka v
očesu, običajno prizadeto eno oko
virusno vnetje: običajno sta vneti
obe očesi, prisoten voden izcedek

PRENOS OKUŽBE

kapljično, ob direktnem stiku,
pri virusnem vnetju tudi
fekalno-oralno

MIKROSPORIJA

INKUBACIJSKA DOBA
7 do 10 dni, redkeje po 3 tednih

ZNAKI

spremembe različnih intenzitet po koži

PRENOS OKUŽBE

Ob neposrednem stiku z bolno živaljo ali
z bolnikom. Možen je tudi posreden
način prenosa preko dlak, lusk in
predmetov iz okolja okužene živali ali
preko predmetov, ki jih je uporabljal
bolnik.

